科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 30 年 8 月 28 日現在

機関番号: 15401

研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2015~2017

課題番号: 15K13487

研究課題名(和文)インスタントン効果の顕在化

研究課題名(英文) Manifestation of instanton effects

研究代表者

本間 謙輔 (Homma, Kensuke)

広島大学・理学研究科・助教

研究者番号:40304399

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,900,000円

研究成果の概要(和文):周期的境界条件によって生ずるトポロジカルに縮退した真空状態を 真空と呼び、インスタントンは異なった巻き付き量子数間のトンネル遷移として解釈される。 真空の存在は、QCDのU(1)問題を解決する上で理論上必要とされ、かつ、QCDラグランジアンのCP不変性を解釈付けるアクシオン場導入の背景としても必須となる。しかし、 真空は解釈のために導入されたという意味で依然として形而上的であり、その物理的実存性が実験的に顕在化できているとは言い難い。そこで 真空の物理的実存性を示すために、インスタントン効果の本質を顕在化させるための実験を試みた。

研究成果の概要(英文): The theta vacuum is known as a state of a degenerate vacuum characterized by its topological nature, the winding number, due to periodic boundary conditions. Instanton is understood as a tunneling transition in between different winding numbers. The theta vacuum is theoretically necessary to resolve the U(1) problem of QCD and also to interpret the CP invariance of the QCD Lagrangian by introducing a hypothetical particle, axion. However, the concept of the theta vacuum is still metaphysical and its physical existence has not been manifestly demonstrated to date. Therefore, we tried to phenomenologically actualize the essence of instanton in the laboratory experiment.

研究分野: 素粒子原子核実験

キーワード: 強い相互作用

1.研究開始当初の背景

これまで素粒子実験が探求してきた真空 構造の解明においては、ヒッグス機構等、そ のポテンシャル中での摂動的な振る舞いに 主眼を置いてきた。一方、ポテンシャルが周 期関数の場合、ソリトン解があり得る。ソリ トン解が成立するためには、縮退した複数の 真空状態が必要となる。この縮退度を巻き付 き数 n と定義し、特に4次元ユークリッド時 空においては静的なソリトン解、インスタン トンの存在が予言されている。この周期条件 によって生ずるトポロジカルに縮退した真 空状態を 真空と呼び、インスタントンは異 なった巻き付き量子数間のトンネル遷移と して解釈される。 真空の存在は、QCD の U(1)問題を解決する上で理論上必要とされ、 かつ、QCD ラグランジアンの CP 不変性を解 釈付けるアクシオン場導入の背景としても 必須となる。しかし、 真空は解釈のために 導入されたという意味で依然として形而上 的であり、その物理的実存性が実験的に顕在 化できているとは言い難い。これは、アハラ ノフ=ボーム効果が実験的に検証される以前 の電磁気学におけるベクトルポテンシャル の物理的実存性の真偽に例えられよう。そこ で 真空の物理的実存性を示すために、イン スタントン効果の本質を顕在化させるため の実験を着想した。

2.研究の目的

真空の実存性を示す現象を探ることを目 的とした。

- 3. 研究の方法
- 4. 研究成果
- 5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 7 件)

[1] Probing vacuum birefringence under a high-intensity laser field with gamma-ray polarimetry at the GeV scale

Yoshihide Nakamiya and Kensuke Homma*,

[2] pseudo-Nambu-Goldstone Exploring bosons by stimulated photon colliders in the mass range 0.1 eV to 10 keV

Kensuke Homma* and Yuichi Toyota,

Prog. Theor. Exp. Phys. 2017 (2017) no.6, 063C01 査読有

[3] Report on OPIC Light Driven Nuclear-Particle 本間謙輔,阪部周二他,レーザー学会学術

physics and Cosmology (LNPC'17)

Kensuke Homma*,

レーザー学会誌レーザー研究 2017 年 10 月 第

[4]Combined Laser Gamma Experiments at ELI-NP

K. Homma, O. Tesileanu, L. D'Alessi, T. Hasebe, A. Ilderton, T. Moritaka, Y. Nakamiya, K. Seto, H. Utsunomiya, Y. Xu,

Romanian Reports in Physics, Supplement, P. S233-S274, 2016 查読有

[5]超高強度レーザー場を用いた宇宙暗黒場の探索 本間謙輔

月刊 OPTRONICS 2016 年 7 月号 35-39 査読無

[6] Testing helicity-dependent $\gamma\gamma \rightarrow$ scattering in the region of MeV

Kensuke Homma*, Kayo Matsuura, Kazuhisa Nakajima, Prog. Thoer. Exp. Phys. 2016 (2016) 1,013C01 査読有

[7] Search for sub-eV scalar and pseudoscalar resonances via four-wave mixing with a laser collider

Takashi Hasebe, Kensuke Homma*, Yoshihide Nakamiya, Kayo Matsuura Kazuto Otani, Masaki Hashida, Shunsuke Inoue, Shuji Sakabe, Prog. Thoer. Exp. Phys. 2015 (2015) 7, 073C01 杳読有

[学会発表](計 16 件)

[1] インスタントン顕在化の試み

本間謙輔, 平原祐輔, 豊田雄一, 井上俊介, 橋田昌樹, 阪部周二, 中宮義英, 日本物理学会第73回年次大会

(一般講演 2018.3.25)

[2] Searches for pseudo Nambu-Goldstone Bosons by stimulated resonant photon-photon scatterings with high-intensity laser fields, <u>Kensuke</u> workshop Homma, 1st on Phenomenology for Particle and Anti-Particle 2018 (PPAP2018) (招待公演 2018.3.7)

[3] レーザーが拓く素粒子・宇宙論的科学

講演会第 38 回年次大会(招待講演 2018.01.24)

[4]高強度レーザー場を用いた真空構造への 多角的アプローチ

本間謙輔, 第7回 日大理工・益川塾連携 素粒子物理学シンポジウム

(招待講演 2017.11.04)

[5] 高強度レーザー場衝突を用いた誘導共鳴 散乱による暗黒場探索

<u>本間謙輔</u>,金沢ダークマター研究会,金沢歌 舞伎座(招待講演 2017.10.03)

[6] Search for new physics using high-intensity laser fields,

<u>K. Homma</u>, Workshop at Aspen Center for Physics: Developing New Tools for Dark Matter Searches, Aspen, USA (招待講演 2017.9.7)

[7] Exploring pseudo-Nambu-Goldstone bosons in the sub-eV to 10 keV mass range with stimulated photon collider, <u>K. Homma</u>, Photon 2017, CERN Geneva, France (招待講演 2017.5.22)

[8] ELI-NP での実験計画

<u>本間謙輔</u>,光量子科学合同シンポジウム, 大阪大学(招待講演 2017.05.09)

[9] Search for Axion-like Particles via optical Parametric effects with High-Intensity laseRs in Empty Space (SAPPHIRES) in a wide mass range

<u>K. Homma</u>, Light driven Nuclear-Particle physics and Cosmology 2017, Yokohama, Japan(一般公演 2017.4.19)

[10] Probing pseudo Nambu-Goldstone bosons via multi-wavelengths four-wave mixing

<u>K. Homma</u>, Axion Dark Matter 2016, Stockholm, Sweden (招待講演 2016.12.7)

[11] Potential to search for Dark Matter with multi-wavelengths light sources

<u>K. Homma</u>, Extreme Light Scientific and Socio-Economic Outlook, Paris, France(招待講演 2016.11.30)

[12] Extracting phase retardation of GeV photons to probe vacuum birefringence in high-intensity laser fields

K. Homma and Y. Nakamiya, 25th ANNUALINTERNATIONAL LASER PHYSICSWORKSHOP (招待講演 2016.07.13)

[13] Search for dark components in the Universe with high-intensity lasers

<u>K. Homma</u>, Energy, Material & Nanotechnology meeting on Laser Matter Interactions, Singapore (招待講演 2016.05.12)

[14] 高強度レーザー場を用いた素粒子物理学の新 展開

<u>本間謙輔</u>, 第 36 回レーザー学会シンポジウム 名城大学天白キャンパス (招待講演 2016.1.11)

[15] A Table-Top Collider with Extreme LightTechnology to Test Elastic Photon-PhotonScattering

 <u>K Homma*</u>, K Matsuura and K Nakajima,
24th ANNUAL INTERNATIONAL LASER
PHYSICS WORKSHOP, Shanghai, China (招待 講演 2015.08.23)

[16] Quantum Optics in the Vacuum toward Laboratory Search for Dark Fields in the Universe

<u>K. Homma</u>, CLE2015, OPTICS & PHOTONICSInternational Congress 2015, Yokohama, Japan(招待講演 2015.04.23)

〔図書〕(計 0 件)

〔産業財産権〕

出願状況(計 0 件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 田原外の別:

取得状況(計 0 件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号:

取得年月日: 国内外の別:

〔その他〕 ホームページ等

6 . 研究組織

(1)研究代表者

本間 謙輔 (Homma Kensuke) 広島大学・大学院理学研究科・助教 研究者番号:40304399

(2)研究分担者 該当なし。

(3)連携研究者

阪部 周二 (Sakabe Shuji) 京都大学・化学研究所・教授 研究者番号:50153903

(4)研究協力者 該当なし。