

令和 2 年 5 月 22 日現在

機関番号：13301

研究種目：研究活動スタート支援

研究期間：2018～2019

課題番号：18H06307・19K21394

研究課題名（和文）MMPsを介したヒト頭頸部扁平上皮癌の微小環境におけるPD-L1の調節機構

研究課題名（英文）Regulatory Mechanisms of PD-L1 in the Microenvironment of Human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma via MMPs.

研究代表者

宮澤 真優子 (mayuko, miyazawa)

金沢大学・附属病院・医員

研究者番号：40825048

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 2,300,000円

研究成果の概要（和文）：本研究は以下の4研究項目のもとに、EMTが誘導する4D型高浸潤口腔癌細胞や癌関連線維芽細胞の形成過程で発現低下するMMPを調べた。さらに、PD-L1を分解するMMPを特定し、既存の抗がん剤のなかからこのMMP発現を上昇させるものを同定した。

1、EMTが誘導する4D型高浸潤口腔癌や癌関連線維芽細胞の形成過程で発現低下するMMPの特定。2、EMTの誘導により4D型高浸潤口腔癌や癌関連線維芽細胞で発現低下するMMPのPD-L1分解活性の検討。3、PD-L1のMMPによる切断活性の検討。4、PD-L1の分解活性を持つMMPを発現上昇させる抗がん剤の検討。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究結果は、PD-1とPD-1リガンドが発見されるまで詳細な解析対象とされてこなかった4D型口腔癌微小環境での免疫寛容に焦点をあて、MMPによる腫瘍免疫調節が高転移性高浸潤型口腔癌へと誘導する可能性を検証する点で独創的である。また、PD-L1の分解を通して腫瘍免疫活性化に働くMMP発現を上昇させる抗がん剤は、抗PD-1療法と併用して効果を高める可能性も考えられる。本研究から得られる結果は、近年急速に注目されている癌免疫療法の有効性を高めるための有益な情報を与える点で意義がある。

研究成果の概要（英文）：This study investigates MMPs that are reduced during EMT-induced formation of 4D type highly invasive oral cancer cells and cancer-associated fibroblasts based on the following four study items. In addition, MMP that degrades PD-L1 is identified, and among the existing anticancer drugs, those that elevate MMPs expression are identified.

1, Identification of MMPs that are reduced during EMT-induced formation of type 4D highly invasive oral cancers and cancer-associated fibroblasts. 2, Examination of PD-L1 degradation activity of MMPs, which are decreased in 4D type highly invasive oral cancer and cancer-associated fibroblasts by inducing EMTs. 3, Examination of the cleavage activity of PD-L1 by MMPs. 4, Investigation of anticancer drugs that elevate the expression of MMPs with degradative activity of PD-L1.

研究分野：口腔癌

キーワード：MMP

様式 C - 19、F - 19 - 1、Z - 19 (共通)

1. 研究開始当初の背景

申請者所属の研究室では、口腔扁平上皮癌の浸潤様式を5段階に分類し、それぞれの段階の癌の性質を調べてきた。そのなかで、最も高浸潤性である4D型(以下4D型高浸潤口腔癌)は高転移性で化学療法や放射線療法への耐性を獲得しており、再発の頻度も高く5年生存率が最も低いことを報告してきた。さらに申請者所属の研究室では、数年前頭頸部癌で適用が承認された分子標的抗癌剤(セツキシマブ)の標的であるEGFR(Epidermal Growth Factor Receptor)の発現が4D型高浸潤口腔癌細胞で低く、そのためにセツキシマブへの感受性が低いことを明らかにした(Oncology Letters, 11: 201, 2016)。さらに上皮間葉移行(Epithelial-Mesenchymal Transition; EMT)関連遺伝子の発現が4D型高浸潤口腔癌細胞で増加し、EMTがEGFR発現低下と関連することを明らかにした(Oncology Letters, 11: 201, 2016)。これらの結果よりセツキシマブ耐性能獲得や4D型高浸潤様式への移行にEMTが関わる可能性が考えられた。

近年、癌免疫療法は外科手術・化学療法・放射線治療の三大標準治療に続く第四の治療法として注目されている。免疫抑制受容体PD-1(programmed cell death 1)は活性化したT細胞に発現して、アポトーシスを誘導しT細胞の機能を抑制する。多くの癌細胞はPD-1リガンド(PD-L1、PD-L2)を発現し、T細胞の機能を抑制するシグナルを送ることで宿主の免疫監視機構から逃れている。4D型高浸潤口腔癌において、少ない数の癌細胞の集団でありながら免疫担当細胞の攻撃から逃避し生存するためには、腫瘍周囲に免疫抑制性の微小環境を構築することが必要である。申請者所属の教室では、ヒト4D型高浸潤口腔癌組織でのPD-L1の発現は癌細胞で低下しているが、腫瘍細胞周囲の間質細胞で発現が亢進していることを報告してきた(Int J Oncol, 2017, 50: 41-48.)。さらに、in vitroで癌細胞でのPD-L1の発現低下や、樹状細胞などの腫瘍周囲細胞での発現亢進にはEMTが関わることを示してきた(Int J Oncol, 2017, 50: 41-48.)。これらの結果は、高浸潤口腔癌微小環境での免疫寛容にEMTが関わる可能性を示唆している。

一方、組織内微小環境を構成する細胞外マトリックスやそれと結合するEMTに関連する生理活性物質の代謝にはMMP(Matrix Metalloproteinase)遺伝子ファミリーが中心的役割を果たしている。これまでに一群のMMPが、頭頸部癌、甲状腺癌、胃癌、乳癌で高発現していることが報告され、MMPの高い細胞外マトリックス分解能から、癌浸潤・転移治療の最適の標的であると考えられてきた。しかしながら、理論的には有効と思われたMMPインヒビターは臨床試験で明らかな治療効果を示さなかった。臨床試験に用いたインヒビターの中にはプラセボと比較して生存率がかえって悪化した症例や、癌の進行や肝転移を促進した例もあった(Nat Rev Cancer, 7: 800, 2007)。臨床試験は凶らずも一部のMMPの腫瘍抑制効果を示唆する結果となった。

最近他の研究室から、EMTにより誘導される癌関連線維芽細胞で発現している一部のMMPがPD-L1に対する分解活性をもち、それによりT細胞の免疫寛容を抑制することが報告された(Oncoimmunology, 5:e1091146, 2016)。この報告から、MMPインヒビターの臨床試験で癌の悪性化が亢進したのは、PD-L1の分解が阻害され、腫瘍免疫が抑制されたことが原因である可能性が示唆された。さらにこの結果から、EMTによる4D型高浸潤口腔癌への移行の際、PD-L1分解活性をもちMMPが発現低下し、腫瘍免疫が抑制されている可能性が考えられることから本研究で明らかにする。

2. 研究の目的

一般的に癌細胞は腫瘍免疫により大部分が死滅するが、悪性度の高い癌細胞は様々な環境で免疫寛容を成立させ生存している。高転移性高浸潤型の口腔扁平上皮癌の浸潤先端部では、僅か数個の癌細胞が周囲微小環境で免疫寛容を成立させ腫瘍免疫から逃れ生存している。画像や手術中に、この少数個の癌細胞を検出することは極めて困難なため、腫瘍切除範囲の設定を誤り、再発の可能性が高まる。よって、高転移性高浸潤口腔癌は予後不良で根本的な治療が困難である。近年、癌免疫療法が注目され、高転移性高浸潤型口腔癌でも抗PD-1抗体の持続的な効果が示されている。しかし、有効である患者は一部に限定されることから、効果を予測するマーカーの開発や、効果の低い患者での併用薬剤の適正選択が課題である。これらの課題の解決のため、本研究は高転移性高浸潤口腔癌の浸潤先端部微小環境での腫瘍免疫調節機構の解明を目的とする。

3. 研究の方法

本研究は以下の4研究項目のもとに、EMTが誘導する4D型高浸潤口腔癌細胞や癌関連線維芽細胞の形成過程で発現低下するMMPを調べる。さらに、PD-L1を分解するMMPを特定し、既存の抗がん剤のなかからこのMMP発現を上昇させるものを同定する。

1、EMTが誘導する4D型高浸潤口腔癌や癌関連線維芽細胞の形成過程で発現低下するMMPの特定。2、EMTの誘導により4D型高浸潤口腔癌や癌関連線維芽細胞で発現低下するMMPのPD-L1分解活性の検討。3、PD-L1のMMPによる切断活性の検討。4、PD-L1の分解活性を持つMMPを発現上昇させる抗がん剤の検討。

4. 研究成果

1 EMTが誘導する4D型高浸潤口腔癌や癌関連線維芽細胞の形成過程で発現低下するMMPの特定：これまでの報告でOSC-20細胞が低浸潤性で上皮系細胞の性質をもちことが明らかになっている。この細胞培養液にTGF- β を添加し、EMTにより4D型高浸潤口腔癌細胞へ誘導した。同様に、ヒト正常歯肉線維芽細胞(HGF細胞)をEMTの誘導により、癌関連線維芽細胞へ移行させた。

これらの培養細胞での MMP 発現を解析し、EMT の誘導で発現低下する MMP を調べた。

2 EMT の誘導により 4D 型高浸潤口腔癌や癌関連線維芽細胞で発現低下する MMP の PD-L1 分解活性の検討：遺伝子導入効率の高い HEK293 細胞に、1 の実験で特定された MMP と PD-L1 のタンパク発現ベクターを共導入し、それぞれのタンパクを恒常的に発現する安定発現細胞株を作製した。PD-L1 の遊離が亢進している MMP 安定発現株を調べ、PD-L1 切断活性をもつ MMP を特定した。

3 PD-L1 の MMP による切断活性の検討：膜結合部位を欠失し、C 末端に 6xHis タグを付加した分泌型 PD-L1 の発現ベクターを作製した。HEK293 細胞にこの PD-L1 発現ベクターを導入し安定発現株を作製した。分泌された PD-L1 は His タグカラムで精製した。精製した PD-L1 をリコンビナント MMP とインキュベートし、切断断片を SDS-PAGE で解析し、PD-L1 に分解活性をもつ MMP を同定した。

4 PD-L1 の分解活性を持つ MMP を発現上昇させる抗がん剤の検討：数種類の培養口腔癌細胞に既存の抗がん剤を添加し、3 で同定した MMP の発現を上昇させる抗がん剤を同定した。さらに、これらの抗がん剤を添加した際、PD-L1 の分解が亢進するかを検討した。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計1件（うち査読付論文 0件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 0件）

1. 著者名 Hira-Miyazawa Mayuko, Nakamura Hiroyuki, Hirai Mariko, Kobayashi Yutaka, Kitahara Hiroko, Bou-Gharios George, Kawashiri Shuichi	4. 巻 52
2. 論文標題 Regulation of programmed-death ligand in the human head and neck squamous cell carcinoma microenvironment is mediated through matrix metalloproteinase-mediated proteolytic cleavage	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 International Journal of Oncology	6. 最初と最後の頁 379-388
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） doi: 10.3892/ijo.2017.4221	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

〔学会発表〕 計0件

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

-

6. 研究組織

氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
---------------------------	-----------------------	----